

Välbekant från förra läsperioden: Summatecken.

Ex:  $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(\frac{2\pi}{6}\right) + \sin\left(\frac{3\pi}{6}\right) + \sin\left(\frac{4\pi}{6}\right) + \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \sum_{n=1}^5 \sin\left(\frac{n\pi}{6}\right)$

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7 = \sum_{n=1}^7 n = \frac{7 \cdot 8}{2} = 28$$

$$\sum_{k=0}^{n-1} r^k = \frac{r^n - 1}{r - 1} \quad | \quad r \neq 0$$


$$\sum_{k=0}^n 2^{3k} = \sum_{k=0}^n (2^3)^k = \sum_{k=0}^n 8^k = \frac{8^{n+1} - 1}{8 - 1} = \frac{8^{n+1} - 1}{7}$$

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad (\text{Bevisas i uppgift 5.1.37})$$

### Areaberäkning

Dela in intervall  $[a, b]$  med punkter  $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$ .

Tre sätt att approximera arean  $A$  mellan  $y = f(x)$  och  $x$ -axeln i det intervallet:



$$L_n = \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x_i$$

Undersumma  $\leq A$

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x_i$$

$L_n \leq S_n \leq U_n$

$$U_n = \sum_{i=1}^n f(u_i) \Delta x_i$$

Översumma  $\geq A$

Större  $n \Rightarrow$  fler punkter och mindre  $\Delta x_i \Rightarrow$  mindre skillnad mellan summa och  $A$

2

Ex

Tolka  $S_n$  som summa av rektangelareor som approximerar någon area i planet. Räkna ut arean  $A = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ .


$$S_n = \sum_{i=1}^n \underbrace{\frac{8}{n}}_{\Delta x_i} \underbrace{\left(1 - \frac{8i}{n}\right)}_{f(x_i)}$$

Om vi sätter  $x_i = \frac{8}{n} i$



så har vi punkter i ett intervall mellan  $a = x_0 = 0$  och  $b = \frac{8}{n} \cdot n = 8$  och har  $f(x_i) = 1 - x_i$ .

Låter vi  $n \rightarrow \infty$  så borde vi alltså få arean mellan x-axeln, linjerna  $x=0$ ,  $x=8$  och kurvan  $y = f(x) = 1 - x$



Alla rektanglar till vänster om  $x=4$  har positiv höjd och area. Alla rektanglar till höger om  $x=4$  har negativ höjd och area.

Da  $n \rightarrow \infty$  får man arean  $\frac{1 \cdot 1}{2}$  för den vänstra triangeln och  $-\frac{7 \cdot 7}{2} = -\frac{49}{2}$  för den högra. Totala arean blir då  $\frac{1}{2} - \frac{49}{2} = -\frac{48}{2} = -24$

Åter till figuren på sid ①. Summorna där ③  
 kallas övre Riemann-summa ( $U_n$ ), undre Riemannsumma ( $L_n$ )  
 och generell Riemann-summa ( $S_n$ ).

Om  $\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \lim_{n \rightarrow \infty} L_n = I$  så säger man att  
 $f$  är integrerbar på  $[a, b]$  och kallar  $I$   $f$ s bestämda  
 integral på  $[a, b]$ . Denna betecknas med symbolen



$$I = \int_a^b f(x) dx$$

### Uppgift 5.3.10

Räkna ut  $U_n, L_n$  och gränsvärdena då  $n \rightarrow \infty$  för  $f(x) = e^x$   
 på intervallet  $[0, 3]$  indelat i  $n$  intervall med längd  $\frac{3-0}{n} = \frac{3}{n}$ .

Vi har alltså punkterna

$$x_0 = 0, x_1 = \frac{3}{n}, x_2 = \frac{6}{n}, x_3 = \frac{9}{n}, \dots, x_n = \frac{3n}{n} = 3, \Delta x_i = \frac{3}{n}$$



$$U_n = \sum_{i=1}^n e^{x_i} \Delta x_i = \sum_{i=1}^n e^{\frac{3}{n}i} \left(\frac{3}{n}\right) = \frac{3}{n} \sum_{i=1}^n \left(e^{\frac{3}{n}}\right)^i = \left[j=i-1\right] = \frac{3}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \left(e^{\frac{3}{n}}\right)^{j+1} = \frac{3}{n} e^{\frac{3}{n}} \sum_{j=0}^{n-1} \left(e^{\frac{3}{n}}\right)^j$$

$$L_n = \sum_{i=1}^n e^{x_{i-1}} \Delta x_i = \sum_{i=1}^n e^{\frac{3}{n}(i-1)} \left(\frac{3}{n}\right) = \left[j=i-1\right] = \frac{3}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \left(e^{\frac{3}{n}}\right)^j = \frac{3}{n} \cdot \frac{\left(e^{\frac{3}{n}}\right)^n - 1}{e^{\frac{3}{n}} - 1} = \frac{3(e^3 - 1)}{n(e^{\frac{3}{n}} - 1)} \quad (1)$$

Vi har alltså  $L_n = e^{\frac{3}{n}} U_n$  så att  $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \lim_{n \rightarrow \infty} U_n$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{e^{\frac{3}{n}}}_{\rightarrow 1} U_n = \lim_{n \rightarrow \infty} U_n$$

så att  $f(x) = e^x$  är integrerbar på  $[0, 3]$  och  $\int_0^3 e^x dx = \lim_{n \rightarrow \infty} U_n$  (2)

④ Gränsvärdet är lite knepigt att räkna ut, men man kan använda derivatans definition på  $a^0$  nämnaren i (1): Då  $n \rightarrow \infty$  så får vi att

$$n \cdot (e^{3/n} - 1) = \frac{e^{3/n} - 1}{\frac{1}{n}} = 3 \cdot \frac{e^{3/n} - 1}{\frac{3}{n}} = 3 \frac{f(0 + \frac{3}{n}) - f(0)}{\frac{3}{n}} \rightarrow 3f'(0) = 3e^0 = 3$$

Insättning i (1) och (2) ger att

$$\int_0^3 e^x dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3(e^3 - 1)}{n \cdot (e^{3/n} - 1)} = \frac{3(e^3 - 1)}{3} = e^3 - 1$$

SVAR:  $\int_0^3 e^x dx = e^3 - 1$

### Teorem 2 (Avsnitt 5.3)

Om  $f$  är en kontinuerlig funktion på  $[a, b]$  så är  $f$  integrerbar på  $[a, b]$ .

För kontinuerliga funktioner behöver man därför inte räkna ut både  $U_n$  och  $L_n$  och kolla om de har samma gränsvärde, utan det räcker att räkna ut en av dem, alternativt  $S_n$  (med beteckningar som på sid ①).

Uppg 5.3.12 Skriv om som integral!

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \sqrt{\frac{i-1}{n}}$$

sätter vi  $x_i = \frac{1}{n} i$  och  $\Delta x_i = \frac{1}{n}$  så får vi  $x_0 = 0, x_n = \frac{1}{n} \cdot n = 1$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \sqrt{\frac{i-1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\sum_{i=1}^n \Delta x_i \sqrt{x_{i-1}}}_{= L_n} = \int_0^1 \sqrt{x} dx$$

(Eftersom  $f(x) = \sqrt{x}$  är kontinuerlig så vet vi att  $L_n \rightarrow \int_0^1 \sqrt{x} dx$  då  $n \rightarrow \infty$ .)

Uppg 5.3.14

5

Skriv om som integral:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{2}{n} \ln\left(1 + \frac{2i}{n}\right)$

För  $x_i = \frac{2}{n}i$ ,  $x_0 = 0$ ,  $x_n = 2$  och den kontinuerliga

funktionen  $f(x) = \ln(1+x)$  på  $[0, 2]$  får vi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{2}{n} \ln\left(1 + \frac{2i}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\sum_{i=1}^n \Delta x_i \ln(1+x_i)}_{= U_n} \stackrel{\text{Theorem 2}}{=} \int_0^2 \ln(1+x) dx$$